505. Hem 9

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING.

N°. 34. DEEL II. 1 Maart 1907.

INHOUD: C. J. H. Bierman, Homopteren aus Semarang (Java), gesammelt von Herrn Edw. Jacobson. — C. J. H. Bierman, Cicadologische Aanteekeningen IV. — Dr. A. J. van Rossum, Een vijand van den pereboom. — Dr. J. C. H. de Meijere, De biologie der Pipunculiden. — Dr. J. Th. Oudemans, Hadena funerea Hein. — Corrigenda. — Dr. J. Th. Oudemans, Insectenkast te koop.

Homopteren aus Semarang (Java), gesammelt von Herrn Edw. Jacobson.

Unser geehrtes Mitglied, Herr Edw. Jacobson, sandte mir eine Anzahl in der Nähe von Semarang gefangener Homopteren. Es ist ein wertvolles Material, mit grosser Sorgfalt gesammelt, enthält daher eine Menge kleinerer Arten, welche gewöhnlich übersehen werden. Einige der merkwürdigsten Funde will ich hier kurz notieren; ich hoffe nachher ausführlicher über dieses Material zu berichten.

Udugama flavocarinata nov. sp. — (Dictyopharinae).

1903. *Udugama* — Melichar. Hom. Fauna Ceylon. p. 27.

Schildchen braun, Kiele gelblich gerandet. Scheitel braun mit oben und unten je drei gelblichen Längsstrichen. Augen braun, am Innenrande gelblich.

Länge 12—13 m.M.

3 Exemplare: 2 ♂♂, 1 ♀.

Smithsonian Institution, AUG 26 1907 National Museum.

Pleroma flavipes nov. sp. — (A c h i l i n a e).

1903. *Pleroma* — Melichar. Hom. Ceylon. p. 41.

Rauchbraun; Kopf, Pronotum, Gesicht, Rostrum, Unterseite und Beine gelblich.

1 Exemplar.

Länge 5 m.M.

Nisia atrovenosa Leth. — (D e r b i n a e).

3 Exemplare.

Elasmoscelis platypoda Kirby. — (L o p h o p i n a e).

12 Exemplare: 7 ♂♂, 5 ♀♀.

Die ♂♂ sind kleiner und schärfer gezeichnet als die ♀♀.

Länge ♂ 6—7 m.M., ♀ bis 8 m.M.

Gelastissus javanensis nov. sp. — (I s s i n a e).

Gelastissus — Kirkaldy. Bull. Hawaiian Sugar Plant. Association N°. 1, Part 9, p. 144. (1906).

Bräunlich; die abgekürzten Decken tiefschwarz; Hinterleib graugrünlich, die unbedeckten Segmente hinten hellrot gerandet.

Länge $2^1/_2$ m.M.

3 Exemplare.

Egropa Jacobsonii nov. sp. — (T e t t i g o m e t r i n i).

1903. *Egropa*. Melichar. Hom. Ceylon. p. 82.

Eine kompliziert gefärbte *Egropa*; besonders gekennzeichnet durch einen querviereckigen Fleck am oberen Stirnrande, in welchem zwei runde weisse ocellenähnliche Flecke stehen.

Diese schöne Art widme ich gerne Herrn Edw. Jacobson.

Länge 4 m.M.

3 Exemplare und viele Nymphen.

Gaetulia nigrovenosa Mel. — (R i c a n i i n a e).

1898. Melichar. Mon. Rican. p. 328. 1. Taf. XIII, Fig. 18.
Ein ♀.

Nephesa brunnea Mel. — (F l a t i n a e).
1902. Melichar. Mon. Acanal. und Flat. p. 104. 6.
Zwei ♂♂.

Idiocerus basalis Mel. — (B y t h o s c o p i n a e).
1903. Melichar. Hom. Ceylon. p. 147. 2.
Zwei ♀♀.

Tettigonia unimaculata Sign. — (T e t t i g o n i n a e).
1854. Signoret. Mon. Tettigonides p. 26. 179.
Zwei ♀♀.

Tettigonia nigrilinea Stål. — (T e t t i g o n i n a e).
1870. Stål. Hem. Ins. Philippinarum p. 735. 11.
Ein ♂.

Platyretus marginatus Mel. — (A c o c e p h a l i n a e).
1903. Melichar. Hom. Ceyl. p. 174. 1.
Ein Pärchen.

Thamnotettix latruncularis Motsch. — (J a s s i n a e).
Ein ♀, welches, so weit man nach der ganz allgemein gehaltenen Beschreibung Motschulsky's urteilen kann, zu dieser Art gehören mag.

Nephotettix apicalis Motsch. — (J a s s i n a e).
Ein helles ♂.

C. J. H. Bierman.